

# 新型コロナウイルス対策として 正しい消毒液の作り方

## 1.使用する塩素系の液体消毒液の確認

使用している消毒液は

です。

例)ピューラックス(6%)、ミルトン(1.1%)  
テキサント(6%)、ハイポライト(10%) 等

濃度  ① %

**重要** 必ず守らないと消毒できません!

## 2.塩素濃度0.05%(500ppm)に希釈し、 次亜塩素酸ナトリウム液を作る

※次亜塩素酸水とは  
異なります

- 環境消毒(テーブルの表面等を消毒)
- 食器やコップ等を消毒

消毒液の濃度(%)

 ①

塩素濃度(%)

÷ 0.05 =

倍に希釈

— (例)ミルトン(1.1%)でコップを消毒(10ℓ洗い桶につけ置き)する場合 —


1.1 ÷ 0.05 = 22倍に希釈

10ℓの1/22量の消毒液が必要

ミルトン必要量 = 10ℓ × 1/22 = 455ml

[手順1]

消毒液を入れる455mlの  
ところに赤テープ等で  
目印をつける



[手順2]

10ℓの目印の赤い  
テープまで水を入  
れて希釈する

←10ℓのところに  
赤テープ等で  
目印をつける

### ポイント

一度、正確に計量したものに  
赤テープ等で目印をつける  
と次からは短時間で消毒液  
を作ることができます。

消毒後、コップ等は洗浄、テーブル  
等は水拭きしましょう(作業の際は  
ゴム手袋を着用してください)